

MAPA ILLUSTRADO

AVES DE EXTREMADURA

Extremadura BIRDING

CLUB BIRDING IN EXTREMADURA

www.birdinginextremadura.com

Español

CULTIVOS AGRÍCOLAS DE REGADÍO

Estación recomendada: Invierno

➔ En Extremadura existen más de 200.000 ha dedicadas a los cultivos de regadío, favorecido por la extensa red de presas y canales existente en la cuenca del río Guadiana y en menor medida en la del Tajo. Desde el punto de vista de las aves, los cultivos de regadío más interesantes son el **maíz** y el **arroz**, especialmente en invierno. Una vez cosechados estos cultivos, entre octubre y noviembre, las aves aprovechan principalmente el grano desperdiciado que queda en los rastrojos tras la cosecha; además, los arrozales permanecen inundados durante la mayor parte del invierno, convirtiéndose en atractivos humedales de aguas someras, por lo que acogen importantes poblaciones de aves y un elevado número de especies.

Entre las aves asociadas a los cultivos de regadío destacan las poblaciones invernantes de **grulla común**, **aguja colinegra**, **gaviota sombría**, **gaviota reidora**, **morito**, **garza real**, **garcilla bueyera**, **garcilla cangrejera**, **garceta común**, **garceta grande**, **cigüeña blanca**, **ánzar común**, **ánade rabudo**, **cuchara común** y **avefría**.

Dentro de las especies limícolas, son importantes los efectivos de **zarapito real**, **cigüeñuela común**, **archibebe común**, **archibebe oscuro**, **chorlito dorado**, **agachadiza común** y **combatiente**. Entre las rapaces destacan las poblaciones de **aguilucho lagunero** y **aguilucho pálido**, que suelen instalar sus dormitorios en arrozales, **elanio azul**, **ratonero común**, **milano real**, **esmerejón** y **lechuza campestre**. Existen ZEPA designadas exclusivamente para proteger las aves de los cultivos de regadío, como **Arrozales de Palazuelo y Guadalperales**, **Vegas del Ruedas**, **Cubilar y Moheda Alta** y **Llanos de Zorita** y **Embalse de Sierra Brava**.




EL BOSQUE MEDITERRÁNEO

Estación recomendada: Primavera Invierno

➔ Es el hábitat más similar al original que hace miles de años cubrió las tierras de Extremadura. Actualmente los mejor conservados se encuentran en las laderas y partes altas de algunas sierras, así como en determinados valles fluviales, compuestos por encinas, alcornoques o robles, con una alta densidad de árboles que llegan a entremezclar sus copas. Suelen estar acompañados de especies arbustivas y de matorral, que en ocasiones alcanzan tal desarrollo que el bosque se convierte en impenetrable.

Algunas de las aves más amenazadas de la península ibérica, como el **buitre negro**, el **águila imperial ibérica** o la **cigüeña negra**, utilizan este hábitat para nidificar, instalando sus nidos en grandes árboles de las laderas de sus sierras. Cuando el bosque está formado exclusivamente por árboles y se ha eliminado gran parte del matorral, abundan aves típicamente forestales como **arrendajo**, **pico picapinos**, **pico menor**, **torcecuello**, **trepador azul**, **agateador común**, **colirrojo real**, **herrerillo capuchino**, **mito**, **pinzón vulgar**, **picogordo**... y en los bosques de robles el **mosquitero papialbo**. Si el estrato arbustivo es abundante, aparecen nidificantes como **petirrojo**, **ruiseñor común**, **chochín** o **curruca capirotada**. Es también el hábitat idóneo para rapaces como el **abejero europeo** -especialmente en los robledales-, **azor**, **gavilán**, **búho chico** y **cárabo**.

Las ZEPA más representativas de este tipo de vegetación son **Sierra de San Pedro**; **Monfragüe** y **las Dehesas del Entorno**, **Sierra de Villuercas** y **Valle del Guadarranque** y **Río Tajo Internacional** y **Riveros**.



LA DEHESA

Estación recomendada: Primavera Otoño Invierno

➔ Se componen principalmente de encinas y alcornoques, si bien a mayor altitud también las hay de robles o de quejigo, y son el paisaje más representativo de Extremadura, ocupando el 35% del territorio. Son el resultado del progresivo aclaramiento del bosque mediterráneo por el ser humano, que mediante la poda periódica y el desbroce ha logrado crear un complejo y sostenible ecosistema.

En las dehesas con alta densidad de arbolado las aves son típicamente forestales: **abubilla**, **tórtola común**, **pito real**, **herrerillo común**, **carbonero común**, **pinzón vulgar**, **mirlo común**, **zorzal charlo**, **papamoscas gris**, **curruca mirlona**, **alcaudón común**, **rabilargo**, **gorriones chillón** y **moruno**, **verderón**... a las que se suman **totovia** y **curruca cabecinegra**, **carrasqueña** y **rabilarga** cuando conservan matorral. Al disminuir la densidad de árboles aparecen otras como **cogujada montesina**, **tarabilla común**, **triguero** o incluso **alcaraván**. En invierno, la **grulla común** y la **paloma torcaz**, atraídas por la abundancia de bellotas, llegan en grandes bandos. También aparecen **avefría**, **lavandera blanca**, **petirrojo**, **colirrojo tizón**, **zorzales común** y **alirrojo**, **mosquitero común** y **camachuelo común**. También es el hábitat de nidificación de rapaces como **elanio azul**, **milano negro**, **ratonero común**, **águila calzada** o **culebrera**, y acuden en busca de alimento otras como el **águila imperial ibérica**, **águila perdicera** y necrófagas como el **buitre leonado**, **buitre negro** o **alimoche**.

Las ZEPA más representativas de este tipo de hábitats son: **Embalse de Cornalvo** y **Sierra Bermeja**; **Dehesas de Jerez**; **Vegas del Ruedas**, **Cubilar** y **Moheda Alta**; **Monfragüe** y **las Dehesas del Entorno**; **Puerto Peña** y **Sierra de los Golondrinos**; **Sierra de la Moraleja** y **Piedra Santa**, **Sierra de Siruela** y **Sierra de Hornachos**.



ÁREAS DE MONTAÑA

Estación recomendada: Primavera Otoño Invierno

➔ En los sistemas montañosos a partir de los 700 m el bosque mediterráneo se ve suplantado por masas forestales caducifolia y de coníferas, compuestas principalmente por **melojares** o **castañares**, con una gran relevancia en Extremadura en las zonas del norte (Sierra de Gata, Las Hurdes, Jerte y La Vera), este de Cáceres (Villuercas) y en el sur de la provincia de Badajoz (sierra de Tentudia).

Son bosques caducifolios exigentes en precipitaciones y frescos durante el verano que aparecen entre los 700 y 1500 m, que son el hábitat de numerosas especies forestales como **gavilán**, **azor**, **abejero europeo**, **picos picapinos** y **menor**, **pito real**, **arrendajo**, **trepador azul**, **curruca mosquitera**, **mosquitero papialbo**, **papamoscas cerrojillo**; **piquituerto** y **verderón serrano** (ambos muy escasos en Extremadura); **herrerillo capuchino**, **carbonero garrapinos**, **escribano soteño**, **reyezuelo listado** y en invernada **reyezuelo sencillo** o **pinzón real**. Más arriba, o en las zonas donde el bosque original se ha degradado, aparecen los brezales y piornales de montaña que suelen cubrirse de nieve durante el invierno y que son el hábitat de especies como el **pechiazul**, **escribanos hortelano** y **montesino**, **curruca rabilarga** y **zarcera**, **collalba gris** o **acentor común**. Y finalmente, por encima de los 1700 m, aparecen prados y cervunales acompañados de canchales y cortados rocosos donde cría el **acentor alpino**, **chova piquirroja**, **bisbita alpino**, **roquero rojo** o **águila real**.

Algunas de las áreas protegidas donde se manifiestan estos hábitats son la reserva natural **Garganta de los Infernos** y las ZEPA **Sierra de Gata** y **Valle de las Pilas**, **Hurdes** y **Sierra de las Villuercas** y **Valle de Guadarranque**.



ÁREAS DE MATORRAL

Estación recomendada: Primavera

➔ La eliminación de los árboles en las dehesas, unido al abandono progresivo de los cultivos agrícolas y la ganadería tradicionales, y la aparición de otros factores como los incendios forestales, han favorecido que se consolide una vegetación con predominio de los matorrales y arbustos mediterráneos. Las formaciones más comunes son los **jarales**, **retamares**, **cantuesares**, **escobonales** y **acebuchares**, mientras que en las zonas con mayor altitud son más frecuentes los **brezales** y **piornales**.

Las aves asociadas a este tipo de vegetación son más numerosas de lo que aparentemente cabría esperar, dependiendo en gran medida de la variedad de especies vegetales que compongan el matorral, su complejidad (altura, cobertura, densidad, etc.) y de la presencia de otros elementos, como pastizales o árboles aislados.

Entre las especies nidificantes destacan **curruca rabilarga**, **curruca cabecinegra**, **curruca tomillera**, **curruca carrasqueña**, **bisbita campestre**, **tarabilla común**, **alzacola** y **pardillo común**. Cuando se abren claros en el matorral y aparecen pastizales, es frecuente encontrar también **collaba gris**, **collalba rubia**, **cogujada montesina** e incluso al **aguilucho cenizo**. En las zonas de mayor altitud, a menudo con nieve en invierno, donde sólo crecen brezales y piornales alternando con pastizales de montaña, pueden encontrarse como nidificantes **acentor común**, **escribano hortelano** y **pechiazul**.

Entre las ZEPA con importantes superficies de matorrales destacan **Sierra de Gata** y **Valle de las Pilas**, **Las Hurdes** y **Nacimiento del Río Gévora**.



HÁBITATS Y SUS AVES EN LA REGIÓN DE EXTREMADURA

EMBALSES Y CHARCAS

Estación recomendada: Primavera Invierno

➔ Los ríos Tajo y Guadiana se encuentran embalsados en buena parte a su paso por Extremadura. Además, la escasez de agua en los meses estivales, ha propiciado la construcción de pequeños embalses y charcas; de hecho, Extremadura es la región española con más costa interior.

En las islas de estos embalses aparecen colonias reproductoras de **charrancito**, **pagaza piconegra**, **canastera**, **cigüeñuela**, **chorlitejo chico** y ocasionalmente **charrán común**. El **cormorán grande** ha comenzado a nidificar también. En los muros de las presas suele observarse **avión roquero** y en ocasiones **roquero solitario**, **collalba negra** o **escribano montesino**. En las charcas con vegetación flotante nidifican **zampullín chico**, **somormujo lavanco**, **focha común** y en ocasiones **fumarel cariblanco** y **avefría**. Y entre las anátidas **ánade friso**, **cuchara común** y puntualmente **pato colorado** y **porrón común**. Las aves acuáticas aumentan en invierno, con poblaciones destacadas de **ánades real**, **rabudo**, **silbón** y **friso**; **cuchara común**; **porrones común** y **moñudo**, **cerceta común** y **pato colorado**. La invernada de **somormujo lavanco** y **zampullines chico** y **cuellinegro** llegar a ser relevante en algunos lugares. También hay dormitorios de **grulla común**, **gaviotas** y **cormorán grande**. Durante sus migraciones, la **cigüeña negra** se concentra aquí en grandes bandos y puede verse con regularidad **águila pescadora**. Entre las ZEPA con embalses y charcas destacan **Embalse de Orellana** y **Sierra de Pela**; **Llanos de Zorita** y **Embalse de Sierra Brava**; **Embalse de los Canchales**; **Embalse de Montijo**; **Embalse de La Serena**; **Embalse de Arrocampo**; **Embalse de Brozas**; **Embalse de Borbollón**; **Embalse de Alcántara**; **Embalse de Talaván**; **Embalse de Valdecañas**; **Embalse de Valungo**; **Embalse de Gabriel y Galán**; **Embalse de Vegas Altas**; **Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera**, **Complejo Lagunar Egidio Nuevo** y **Charca de la Dehesa Boyal de Navalmaral**.




RÍOS Y ARROYOS

Estación recomendada: Primavera Verano

➔ Los cursos fluviales pueden ser muy diferentes dependiendo de su anchura, profundidad del cauce, altitud a la que se encuentren y vegetación asociada. En los cursos permanentes aparecen **alisos**, **fresnos**, **chopos** y **saucos**, mientras que en los cursos estacionales, casi siempre secos en el estío, predominan especies adaptadas a la falta de agua como la **adelfa** y el **tamujo**.

Las principales aves asociadas a la vegetación ribereña son **ruiseñor común**, **zarcero común**, **petirrojo**, **curruca capirotada**, **pájaro moscón**, **oropéndola** y **escribano soteño**. También de hábitos nocturnos como el **chotacabras pardo**. Y en los ríos de norte de la región **mirlo acuático** y **lavanderas cascadeña** y **blanca**, esta última, mucho más extendida por todas las zonas húmedas de la región. En los cauces con abundante vegetación emergente nidifican pequeñas aves como **carricero común**, **carricero tordal** o **ruiseñor bastardo**, incluso exóticas como **bengalí rojo** o **pico de coral**. Cuando esta vegetación ocupa grandes superficies, aparecen poblaciones de **garza imperial**, **avetorillo**, **rascón** o incluso especies más infrecuentes como **calamón** o **buscarla unicolor**. Hay importantes colonias de **garzas** en los árboles de las riveras, algunas con miles de aves, donde nidifican conjuntamente **garcilla bueyera**, **garceta común**, **garza real**, **martinete**, **cigüeña blanca** y ocasionalmente **garcilla cangrejera** y **espátula**. Y en los cortados arenosos de las orillas **martín pescador** y colonias de **avión zapador** y **abejaruco**, cuyos huecos son aprovechados a veces por **carraca** o **gorrión chillón**.

Entre las ZEPA que incluyen cursos fluviales merece destacar **Azud de Badajoz**; **Embalse de Montijo**; **Río y pinares del Tiétar**, **Riveros del Almonte** y **Vegas del Ruedas**, **Cubilar** y **Moheda Alta**.



CULTIVOS Y PASTIZALES

Estación recomendada: Primavera Invierno

➔ Son la última etapa en la degradación del bosque mediterráneo, tras desaparecer la mayor parte de los árboles, arbustos y matorral. Ocupan grandes extensiones de terreno de llanura y suelen estar asociados a la presencia de cultivos de cereales de secano. Su especie reproductora más representativa es la **avutarda**, además de **sísón**, **ganga ibérica**, **ortega**, **canastera**, **mochuelo común** y **alcaraván**. En los cultivos se establece el **aguilucho cenizo**, ocasionalmente acompañado por alguna pareja de **aguilucho lagunero** y más raramente de **aguilucho pálido**. En las casas de campo nidifican la **carraca** y colonias de **cernicalo primilla**. Y como en las dehesas, la abundancia de **urracas** hace posible la presencia del **crialo**, parásito de sus nidos.

Entre las comunidades de pájaros destacan las poblaciones de **cogujadas montesina** y **común**, **calandria**, **terrera común**, **bisbita campestre**, **buitrón**, **collalba rubia**, **alcaudón real** y **triguero**. En invierno se enriquece con nuevas aves llegadas del norte como **grulla común**, **chorlito dorado**, **avefría**, **aguilucho pálido**, **esmerejón**, **bisbita común**, **alondra común**, **jilguero** o **lavandera blanca**. La abundancia de alimento atrae a aves que nidifican en otros hábitats, como **águila imperial ibérica**, **águila perdicera**, **águila real**, **culebrera europea**... o necrófagas atraídas por el ganado como **buitre leonado**, **buitre negro** y **alimoche**.

Las ZEPA con mayor superficie de cultivos y pastizales son **La Serena** y **Sierras Periféricas**; **Llanos de Cáceres** y **Sierra de Fuentes**; **Llanos de Trujillo**; **Magasca**; **Llanos de Alcántara** y **Brozas** y **Campiña Sur** y **Embalse de Arroyo Conejo**. También áreas de **Dehesas de Jerez**, **Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera** y **Llanos de Zorita** y **Embalse de Sierra Brava**.



ZONAS DE ROQUEDO

Estación recomendada: Primavera

➔ Muchas de las sierras extremeñas están coronadas por grandes roquedos de cuarcita, que emergen sobre la densa vegetación del bosque mediterráneo o de las dehesas. La seguridad de esas rocas, con frecuencia inaccesibles, y la densa barrera que constituye la vegetación de las laderas que las preceden, propician que algunas aves seleccionen estos lugares para nidificar y eviten así las molestias humanas o de sus depredadores naturales.

Entre las típicas aves nidificantes de los roquedos se encuentran rapaces amenazadas como el **buitre leonado**, que suele formar grandes colonias características como las de **Monfragüe**, que cuentan con más de 500 parejas reproductoras. También **alimoche**, **águila perdicera**, **águila real**, **halcón peregrino**, **cernicalo vulgar** y **búho real**. Y más de un 40% de la población de **cigüeña negra** los elige para nidificar en lugar de los grandes árboles que prefiere el resto. Este hábitat es también muy específico de algunas especies durante la reproducción, como es el caso del **avión roquero**, **vencejo real**, **vencejo cafre**, **collalba negra**, **roquero solitario**, **roquero rojo**, **escribano montesino**, **grajilla**, **cuervo** y **chova piquirroja**. Mientras en invierno, en sierras de altitud media y alta, se puede observar el **acentor alpino** y muy excepcionalmente el **treparriscos**.

Los mejores roquedos para ver aves se encuentran en las siguientes ZEPA: **Monfragüe** y **las Dehesas del Entorno**; **Embalse de Orellana** y **Sierra de Pela**; **Sierra de Villuercas** y **Valle del Guadarranque**; **Canchos de Ramiro** y **Ladronera**; **La Serena** y **Sierras Periféricas**; **Sierras de Peñalsordo** y **Capilla**; **Sierra de la Moraleja**, **Sierra de Hornachos** y **Sierras Centrales** y **Embalse de Alange**.



MAPA DE UBICACIÓN

CLUB BIRDING IN EXTREMADURA

Desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura hemos impulsado el *Club Birding in Extremadura* con el propósito de ayudarte a obtener una experiencia satisfactoria en tus vacaciones, facilitándote, como amante de la ornitología que elige nuestra región, el acceso a los mejores servicios de observación de aves: alojamientos, guías, oficinas de información turística, etc.

Nuestro *Club* es un grupo voluntario que reúne los intereses del sector privado y público para desarrollar aún más el turismo ornitológico en nuestra región, agrupando los mejores servicios de observación de aves en Extremadura, con criterios rigurosamente aplicados.

Sea cual sea tu procedencia o nacionalidad, si practicas la observación de aves ahora puedes planificar tus vacaciones en Extremadura con mucha más facilidad, encontrando en el *Club Birding in Extremadura* los servicios que mejor se adapten a tus necesidades y expectativas.

Síguenos en las redes sociales

BirdinginExtremadura

@birdextremadura

birdextremadura

Descarga la APP

Birding in Extremadura

Google play

App Store

www.birdinginextremadura.com

Extremadura

Junta de Extremadura

Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte

PUEBLOS Y CIUDADES

Estación recomendada: Primavera

➔ Numerosos pueblos y ciudades de Extremadura son excelentes lugares para la observación de las aves, pues ofrecen lugares idóneos para instalar sus nidos y se encuentran próximos a sus áreas de alimentación. Los edificios históricos suelen ser los emplazamientos seleccionados para nidificar por la abundancia de huecos y soportes para instalar sus nidos, como los de **cigüeña blanca** en los campanarios de las iglesias, que constituyen una de las imágenes más representativas de la región.


Estos edificios acogen nutridas colonias de **cernicalo primilla**, que en ocasiones llegan a superar las 50 parejas. También conviven en los mismos lugares **grajilla**, **vencejo pálido**, **vencejo común** y **lechuza común**. En los grandes puentes, algunos de ellos de la época romana, se instalan los **vencejos reales**. Los tramos urbanos del río Guadiana a su paso por Mérida y Badajoz, han sido elegidos por las **garzas** para instalar sus bulliciosas colonias de reproducción, ajenas completamente a la intensa actividad humana. Igualmente llamativas son las colonias de **avión común** en muchos edificios y puentes, compartiendo los núcleos urbanos con la **golondrina común** y ocasionalmente el **avión roquero**.

Extremadura es de las pocas regiones europeas que ha designado ZEPA dentro de los núcleos urbanos, contando en la actualidad con 18 pueblos y ciudades protegidos por su importancia para las aves, especialmente por sus colonias de **cernicalo primilla**: **Cáceres**, **Plasencia**, **Trujillo**, **Llerena**, **Zafra**, **Almendralejo**, **Acedera**, **Alburquerque**, **Brozas**, **Belvis de Monroy**, **Fuente de Cantos**, **Garrovillas**, **Guareña**, **Jerez de los Caballeros**, **Ribera del Fresno**, **San Vicente de Alcántara**, **Saucedilla** y **Jaraiz de La Vera**. Finalmente, la ZEPA **Casa de la Enjarada**, en las inmediaciones de Cáceres.

Aves de Extremadura

Mapa ilustrado

Gracias al excelente estado de conservación de sus hábitats, Extremadura es un paraíso ornitológico que cuenta con 71 ZEPZ (zonas de especial protección para las aves) con más de un millón de hectáreas –el 26,15% de su territorio– en las que se han inventariado hasta la fecha 340 especies de aves, 288 de ellas nidificantes.



Cigüeña negra
Ciconia nigra



Águila imperial ibérica
Aquila adalberti




Rabiblarjo ibérico
Cyanopica cooki



Abubilla
Upupa epops



Aguiucho cenizo
Circus pygargus



Grulla
Grus grus



Extremadura
BIRDING



Collalba negra
Oenanthe leucura



Mapa de ubicación



Culebrera europea
Circus cyaneus



Buitre negro
Aegypius monachus



Carraca europea
Coracias garrulus



Águila perdicera
Aquila fasciata




Abejaruco
Merops aplaster



Cernicalo primilla
Falco naumanni



Avutarda
Otis tarda



Extremadura
BIRDING

Escala: 1:27000

Áreas naturales protegidas de Extremadura

Leyenda

- Parque nacional
- Geoparque UNESCO

- Reserva de la biosfera
- Parque natural
- Reserva natural

- Zonas de especial protección para aves
- Monumento natural
- Paisaje protegido

- Parque periurbano de conservación y ocio
- Corredor ecológico y de biodiversidad
- Sitio RAVISAR

- Colonia de cernicalo primilla



Accede a toda la información de las rutas de Birding in Extremadura

